

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan medikasi pasien Tuberkulosis Paru di Kabupaten Ngawi adalah *Predisposing factors* yang meliputi lama pengobatan, pengetahuan, motivasi sembuh, dan persepsi diri; *Enabling factors* yang terdiri dari akses terhadap fasilitas kesehatan; serta *Reinforcing factors* yang mencakup peran Pendamping Minum Obat (PMO) dan dukungan keluarga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan beberapa saran. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Tuberkulosis dan memberikan dukungan sosial serta emosional kepada pasien Tuberkulosis Paru guna meningkatkan kepatuhan medikasi. Bagi instansi terkait dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya, mengembangkan fasilitas kesehatan, melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap program pengendalian Tuberkulosis Paru, serta meningkatkan edukasi tentang Tuberkulosis Paru kepada masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan desain *case control* guna membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol dan meneliti faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan medikasi pasien Tuberkulosis Paru.